

# Informationsblatt

## Richtige Zubereitung und Einnahme von Pleinvue Darmspüllösung

### Liebe Patientin, lieber Patient!

Für Ihre bevorstehende Untersuchung ist ein **sauberer Darm** die wichtigste Voraussetzung. Dafür wird die Darmspüllösung Pleinvue verwendet. Eine Packung enthält 3 Beutel: **1 Beutel für Dosis 1** (1) und **2 Beutel für Dosis 2** (2A & 2B).

### Ihr Untersuchungstermin ist dabei wichtig

Datum  um  Uhr

**Einnahme von Pleinvue – für Ihre Untersuchung vor 14 Uhr**

#### Dosis 1 – 500 ml Pleinvue + 1 Liter Flüssigkeit

- 1) Trinken Sie **500 ml Pleinvue** (Beutel 1) alle 10 Minuten ein Glas innerhalb von 30 Minuten am Vorabend des Untersuchungstages.

zwischen  und  Uhr

- 2) Trinken Sie innerhalb der darauffolgenden Stunde zusätzlich **1 Liter klare Flüssigkeit**: Apfelsaft, Wasser oder Tee aber keine Milch und keine dunkel gefärbten Säfte. (Bitte nehmen Sie keine feste Nahrung zu sich!)

#### Dosis 2 – 500 ml Pleinvue + 1 Liter Flüssigkeit

- 1) Trinken Sie **500 ml Pleinvue** (Beutel 2A & 2B) alle 10 Minuten ein Glas innerhalb von 30 Minuten am Morgen des Untersuchungstages.


zwischen  und  Uhr

Bitte beachten Sie, dass Pleinvue **mindestens 3,5 Stunden vor Ihrer Untersuchung** vollständig eingenommen werden muss.

- 2) Trinken Sie innerhalb der darauffolgenden Stunde zusätzlich **1 Liter klare Flüssigkeit**: Apfelsaft, Wasser oder Tee aber keine Milch und keine dunkel gefärbten Säfte. Danach nichts mehr trinken! (Bitte nehmen Sie keine feste Nahrung zu sich!)

### Achtung!


**Halten Sie sich während der Einnahme von Pleinvue in Reichweite einer freien Toilette auf!**



#### Am Vorabend des Untersuchungstages



#### Am Morgen des Untersuchungstages



**Einnahme von Pleinvue – für Ihre Untersuchung nach 14 Uhr**

**Dosis 1 – 500 ml Pleinvue + 1 Liter Flüssigkeit**

- 1) Trinken Sie **500 ml Pleinvue** (Beutel 1) alle 10 Minuten ein Glas innerhalb von 30 Minuten am Morgen des Untersuchungstages.

zwischen  und  Uhr

- 2) Trinken Sie innerhalb der darauffolgenden Stunde zusätzlich **1 Liter klare Flüssigkeit**: Apfelsaft, Wasser oder Tee aber keine Milch und keine dunkel gefärbten Säfte. (Bitte nehmen Sie keine feste Nahrung zu sich!)

**Dosis 2 – 500 ml Pleinvue + 1 Liter Flüssigkeit**

- 1) Trinken Sie ca. 4 Stunden vor der Untersuchung **500 ml Pleinvue** (Beutel 2A & 2B) alle 10 Minuten ein Glas innerhalb von 30 Minuten.

zwischen  und  Uhr

Bitte beachten Sie, dass Pleinvue **mindestens 3,5 Stunden vor Ihrer Untersuchung** vollständig eingenommen werden muss.

- 2) Trinken Sie innerhalb der darauffolgenden Stunde zusätzlich **1 Liter klare Flüssigkeit**: Apfelsaft, Wasser oder Tee aber keine Milch und keine dunkel gefärbten Säfte. Danach nichts mehr trinken! (Bitte nehmen Sie keine feste Nahrung zu sich!)

**Tipp**

- ▶ Trinken Sie Pleinvue **gekühlt**.

**Achtung!**


**Halten Sie sich während der Einnahme von Pleinvue in Reichweite einer freien Toilette auf!**

Wir hoffen, Ihnen geholfen zu haben und wünschen Ihnen alles Gute!

**Doz. Dr. Wolfgang Sieghart & Ihr Imed19 Endoskopie-Team**

**Am Morgen des Untersuchungstages**

**Dosis 1**




**Beutel 1  
in Wasser auflösen**

**+ 1 L  
trinken**

**4 Std. vor der Untersuchung**

**Dosis 2**



**Beutel 2A & 2B  
in Wasser auflösen**

**+ 1 L  
trinken**