

Informationsblatt

Richtige Zubereitung und Einnahme von Pleinvue Darmspüllösung

Liebe Patientin, lieber Patient!

Für Ihre bevorstehende Untersuchung ist ein **sauberer Darm** die wichtigste Voraussetzung. Dafür wird die Darmspüllösung Pleinvue verwendet. Eine Packung enthält 3 Beutel: **1 Beutel für Dosis 1** (1) und **2 Beutel für Dosis 2** (2A & 2B).

Ihr Untersuchungstermin ist dabei wichtig

Datum um Uhr

Einnahme von Pleinvue – für Ihre Untersuchung vor 14 Uhr

Dosis 1 – 500 ml Pleinvue + 1 Liter Flüssigkeit

- 1) Trinken Sie **500 ml Pleinvue** (Beutel 1) alle 10 Minuten ein Glas innerhalb von 30 Minuten am Vorabend des Untersuchungstages.

zwischen und Uhr

- 2) Trinken Sie innerhalb der darauffolgenden Stunde zusätzlich **1 Liter klare Flüssigkeit**: Apfelsaft, Wasser oder Tee aber keine Milch und keine dunkel gefärbten Säfte. (Bitte nehmen Sie keine feste Nahrung zu sich!)

Dosis 2 – 500 ml Pleinvue + 1 Liter Flüssigkeit

- 1) Trinken Sie **500 ml Pleinvue** (Beutel 2A & 2B) alle 10 Minuten ein Glas innerhalb von 30 Minuten am Morgen des Untersuchungstages.


zwischen und Uhr

Bitte beachten Sie, dass Pleinvue **mindestens 3,5 Stunden vor Ihrer Untersuchung** vollständig eingenommen werden muss.

- 2) Trinken Sie innerhalb der darauffolgenden Stunde zusätzlich **1 Liter klare Flüssigkeit**: Apfelsaft, Wasser oder Tee aber keine Milch und keine dunkel gefärbten Säfte. Danach nichts mehr trinken! (Bitte nehmen Sie keine feste Nahrung zu sich!)


Achtung!

Halten Sie sich während der Einnahme von Pleinvue in Reichweite einer freien Toilette auf!



Am Vorabend des Untersuchungstages

Dosis 1




Beutel 1
in Wasser auflösen



trinken

Am Morgen des Untersuchungstages

Dosis 2



Beutel 2A & 2B
in Wasser auflösen



trinken

Einnahme von Pleinvue – für Ihre Untersuchung nach 14 Uhr

Dosis 1 – 500 ml Pleinvue + 1 Liter Flüssigkeit

1) Trinken Sie **500 ml Pleinvue** (Beutel 1) alle 10 Minuten ein Glas innerhalb von 30 Minuten am Morgen des Untersuchungstages.

zwischen und Uhr

2) Trinken Sie innerhalb der darauffolgenden Stunde zusätzlich **1 Liter klare Flüssigkeit**: Apfelsaft, Wasser oder Tee aber keine Milch und keine dunkel gefärbten Säfte. (Bitte nehmen Sie keine feste Nahrung zu sich!)

Dosis 2 – 500 ml Pleinvue + 1 Liter Flüssigkeit

1) Trinken Sie ca. 4 Stunden vor der Untersuchung **500 ml Pleinvue** (Beutel 2A & 2B) alle 10 Minuten ein Glas innerhalb von 30 Minuten.

zwischen und Uhr

Bitte beachten Sie, dass Pleinvue **mindestens 3,5 Stunden vor Ihrer Untersuchung** vollständig eingenommen werden muss.

2) Trinken Sie innerhalb der darauffolgenden Stunde zusätzlich **1 Liter klare Flüssigkeit**: Apfelsaft, Wasser oder Tee aber keine Milch und keine dunkel gefärbten Säfte. Danach nichts mehr trinken! (Bitte nehmen Sie keine feste Nahrung zu sich!)

Tipp

▶ Trinken Sie Pleinvue **gekühlt**.

Achtung!


Halten Sie sich während der Einnahme von Pleinvue in Reichweite einer freien Toilette auf!

Wir hoffen, Ihnen geholfen zu haben und wünschen Ihnen alles Gute!

Priv. Doz. Dr. Wolfgang Sieghart & Ihr Imed19 Endoskopie-Team

Am Morgen des Untersuchungstages

Dosis 1



Beutel 1 in Wasser auflösen




+

1 L trinken

4 Std. vor der Untersuchung

Dosis 2



Beutel 2A & 2B in Wasser auflösen



+

1 L trinken