

Informationsblatt

Verhaltensmaßnahmen nach einer Endoskopie

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bei Ihnen fand eine endoskopische Untersuchung (Gastroskopie und/oder Koloskopie) ambulant mit oder ohne Sedierung statt.

Gastroskopie (Magenspiegelung)

Wenn bei Ihnen eine Gastroskopie durchgeführt wurde, dürfen Sie **erst wieder essen und trinken**, sobald **das betäubte Gefühl** im Rachen (durch die Lokalbetäubung) **komplett verschwunden ist** (Dauer: ca. 1 Stunde), bzw. **nach Angabe des untersuchenden Arztes**.

Koloskopie (Darmspiegelung)

Wenn bei Ihnen eine Koloskopie durchgeführt wurde, dürfen Sie danach sofort wieder essen und trinken.

Sedierung

Im Falle einer Sedierung **dürfen Sie für 24 Stunden nicht** aktiv am Straßenverkehr teilnehmen, insbesondere **kein Fahrzeug lenken, keine wichtigen Entscheidungen treffen** (z.B. Verträge unterschreiben) und **keine Maschinen bedienen**.

Bei Auftreten folgender Symptome:

- ▶ Schmerzen
- ▶ Herzrasen
- ▶ Bluterbrechen
- ▶ Schwindel
- ▶ Fieber
- ▶ schwarzer oder blutiger Stuhl

wenden Sie sich bitte unverzüglich an **Imed19**, Ihren **Hausarzt** oder an das **nächste Krankenhaus** (Notaufnahme).

Wir hoffen, dass wir Ihren Aufenthalt bei uns so angenehm wie möglich gestalten konnten und wünschen Ihnen alles Gute!

Doz. Dr. Wolfgang Sieghart & Ihr Imed19 Endoskopie-Team